

***Pholcus hieroglyphicus* Pavesi, 1883**

Pavesi, P. 1883. Aracnidi del regno di Scioa. Ann. Mus. civ. stor. nat. Genova 20: 1-105.

p. 37

30. **Ph. hieroglyphicus**, n. *cephalothorace testaceo-vivido, marginibus subtiliter vittaque media longitudinali nigricantibus, hac vitta in parte thoracica geminata, antice fere ad marginem clypei perti-*

p. 38

nenti, postice duabus maculis nigris arcuatis sequuta; sterno testaceo inermi; pedibus exilissimis, testaceis, nigricante-annulatis; abdomine cylindrico, postice truncato, cinereo, in dorso vitta media fusca rosarium figurante lineis fuscis limitata, ventre vitta media continua nigricanti; scuto vulvae inverse pentagonali, lateribus posticis tuberculis ovatis. Long. max. ♀ circa 5 mill. Mas ignotus.

Cephalothorace lungo poco più di 1 mill., rotondato, parte cefalica ben distinta da impressioni forti, in forma di cuneo più largo e più alto al davanti, cogli angoli sormontati dagli occhi laterali, tronco al di dietro, superficie glabra; di color testaceo vivace, con sottile marginatura nerastra, dentata all'interno in due solchi raggianti; una fascia longitudinale nerastra, stretta sul clipeo al davanti degli occhi mediani, comincia presso il margine facciale, comprende tutta la testa e sorpassa la metà del torace, essendo quivi divisa da una linea chiara in corrispondenza della rima mediana; dopo questa fascia prendono origine due macchie nere piriformi, ingrossate all'indietro, le quali figurano due archi divergenti con la convessità interna, che si dirigono verso la marginatura del torace senza raggiungerla. *Clipeo* alto 1 volta e $\frac{1}{2}$ la lunghezza delle mandibole. *Occhi* mediani piccoli, neri, distanti dai gruppi laterali più di 1 diametro; occhi laterali molto sporgenti, subeguali, l'interno un po' più piccolo. *Mandibole* coniche, grosse quanto i femori delle zampe, sfumate di nero alla superficie anteriore. *Mascelle e labbro* nereggianti, con margine testaceo. *Sterno* rotondato, convesso, inerme, testaceo. *Palpi* brevi, tenui, nereggianti. *Zampe* I. 4. 2. 3 (I. 32 mill., II. 20 $\frac{1}{2}$, III. 13, IV. 21 $\frac{1}{2}$, lunghezza del metatarso I. 12 mill.), lunghe, sottili, esilissime ai tarsi, pubescenti, granulose, testacee a patelle nerastre, con un anello preapicale nerastro sui femori e sulle tibie ed un anello basale più stretto sulle tibie e sui tarsi. *Addome* cilindrico, un po' più stretto e tronco all'estremità posteriore; grigio, percorso sul dorso da una fascia mediana bruno-nerastra a forma di coroncina, cioè strozzata in quattro punti trasversali e raddoppiata all'esterno da due linee nerastre; il piano posteriore quasi verticale è di color grigio-testaceo, marginato di bruno, con denta-

ture brune che sporgono verso l'interno. Ventre grigio, con una stretta fascia mediana nerastra, continua dall'epigina alle filiere. *Vulva* formata da uno scudo rosso-bruno, largo, inversamente pentagonale, a vertice ottuso, portante ai lati posteriori due corpi ovoidali (borse seminali) succinei.

Una sola femmina dei monti di Let-Marefià (primavera 1877). Ricorda nel disegno del cefalotorace le *Scytodes*, epperò s' avvicina al *Pholcus distinctus* Cambr. di Seilan e S. Elena, come per il disegno dell'addome al *Ph. vexillifer* Butl. di Rodriguez, ma non può confondersi con alcuna per i caratteri sopradescritti.

Huber, B. A. 2011. Revision and cladistic analysis of *Pholcus* and closely related taxa (Araneae, Pholcidae). Bonner zool. Monographien 58: 1-510.

p. 185

Three species are assigned tentatively based on a similar trochanter apophysis (*Ph. taibeli*, *Ph. vatovae*), and apparently similar color patterns (*Ph. hieroglyphicus*). The types of these species could not be located (in particular, they could not be found in MZF: L. Bartolozzi, pers. comm. Feb. 2007), and no new material is available.

p. 186




FIG. 846. Known distribution of the *Pholcus chappuisi* species group.

Composition. The *Ph. chappuisi* group includes eight species; of these, three are newly described below, two are redescribed. Core group: *Ph. chappuisi* Fage, 1936; *Ph. twa* n. sp.; *Ph. kyondo* n. sp.; *Ph. strandi* Caporiacco, 1941; *Ph. bikilai* n. sp.; assigned tentatively: *Ph. taibeli* Caporiacco, 1949; *Ph. hieroglyphicus* Pavesi, 1883; *Ph. vatovae* Caporiacco, 1940.